

Ficha Técnica BIOINSET 800 SC

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: BIOINSET 800 SC

Nome Comum: Fipronil e Imidacloprid

Categoria: Inseticida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0040

Composição química: **Fipronil:** (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfanylpyrazole-3-carbonitrile

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

COMPOSIÇÃO:

Fipronil17,5 g/L (1,75% v/v)
Imidacloprid 75 g/L (7,50% v/v)
Inertes907,5 g/L (90,75% v/v)

INDICAÇÕES DE USO:

BIOINSET 800 SC é um inseticida formulado com FIPRONIL + IMIDACLOPRID, que associados, potencializam a eficiência no controle de cupins de solo (*Nasutitermes sp.*), formiga cortadeira (*Atta sexdens rubropilosa*), formiga faraó (*Monomorium floricola*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*) e baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), para aplicação por profissionais em áreas de construção civil, estabelecimentos comerciais, residências, indústrias e logradouros públicos.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem	
	ml / litro de água	
Cupim, Formigas	50 /20	200 ml/m ²
Baratas	25 /10	200 ml/m ²
Pulgas	25 /10	50 ml/m ²

Cupins: Prepare a calda diretamente no tanque do pulverizador, diluindo 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Aplicar a dose de 200 ml/m² da calda preparada diretamente nos locais a serem tratados como nos alicerces, trincheiras, rodapés dos muros das construções e pós construções dos imóveis.

Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Aplicar a calda em uma área de 200 m², usando um pulverizador ou regador, aplicando sobre as formigas em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

Baratas: Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Pulgas: Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² em assoalhos, frestas e rachaduras e nos locais onde há a movimentação e infestação destas pragas.

PRECAUÇÕES: CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

-Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto:6(seis)horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

-Após aplicação, abrir portas e janelas para aeração do local tratado, diminuindo a incidência dos resíduos do ativo no ambiente.

-Visando reduzir a probabilidade de exposição, e garantir melhor eficiência do produto, realizar a aplicação em áreas pontuais, sem a necessidade de aplicação por todo ambiente.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. - Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. - Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Absorver os produtos com o uso de materiais inertes, tais como, areia e serragem. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Nas embalagens vazias, faça a triplíce lavagem e utilize a água no preparo da calda; após descarte de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan

CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenil Pirazol/ Neonicotinóide

Nome Comum: Fipronil / Imidacloprid

Antídoto/Tratamento: Tratamento Sintomático/ Não há antídoto específico.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018

Tel: 16 3663.1000

Rua Adelaide Zangrande, 141-A

Distrito Industrial • Jardinópolis • SP

CNPJ: 05.328.961/0001-43

I.E.: 399.077.183.110

WWW.INSETIMAX.COM.BR